## 庫全書

子部

欽定四庫

子部

證治準 絕卷二十七

詳校官太醫院吏目臣周世泰 編修臣倉聖脈覆勘 腾绿監生臣喻泰偕校對官中書臣吳 俊總校官進士臣来 鈴

100 Court State South Character and the second of the second を できる 一名 1.1 古から、北京第四大 古場 A ..... 明本智慧 證治學蠅 及各四雨甘草 一撰 雨 炙

金豆四月全書 聖散保疎風和血 治 緩 早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散 右將阜角刺燒灰研細用大黄半雨煎湯調下二 右為末每服二錢食後溫酒調下 一黄半年角刺三 柴湯車 令減半取 出二兩去皮 尖 出 令乾另研 温煎

為細末二味另放麝香蜜蟲水蛭三味為末另放外 右對如麻豆大除連翹另對梧桐淚研白豆蔻二分 再入梧桐淚白豆蔻二味并麝香等三味再上火煎 生地黄如桃仁拉桔梗如麝香竹梧桐淚一水蛭 煙重宝點少三百條少五五日 服水二大蓋酒一起入連翹煎至一蓋六分 推治洋繩 當歸

醉仙散發治厲風遍身麻木 茶清調晨午各吃一 硬物 右為細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勺每服 令人如醉或下如膿血病根乃去仍量人病之輕重 藜 胡麻子,牛蒡子,枸杞子 二沸去查稍热早飯後午飯前服忌酒濕麵生冷 苦麥 防風 服至五七日於牙缝中出臭涎 瓜莫根公五 夢剃子,西白葵

大小口口 like 通天再造散 地黄湯此指七味白术散見消 為黄散見強小柴胡湯見在未黃連解毒湯見在犀角 虚實用病重者必須先以再造散下之候元氣將復 右為細末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下 以淡酒蒸熟食之可以助藥勢 方用此藥忌一切炙煿厚味止可食淡粥時菜諸蛇 鬱金非大黄 早角刺黑大者炒 治大風惡疾 避治準婦 白牵牛生

寳鑑换肌散 加味逍遙散 金好口屋有電 其効如神 右作一刻水煎服 頰赤口燥咽乾發熱盗汗食少嗜臥 當歸 白花蛇 甘草文山梔りる 芍藥酒茯苓 黑花蛇海溪 地龍土當歸 治癘風久不愈或眉毛脱落鼻梁崩壞 治血虚有熟遍身瘙痒心煩目昏怔忡 白术以各柴胡女牡丹皮 細辛

麻湯 右各另為末每服五錢溫酒調下食後酒多尤妙 į 定風草 不灰木 皮臍養术 袍 天麻 /. 1 :-治風熱身如蟲行或唇反綻裂 白芷 何首烏不凡川苦 甘造 木鼈子雨 蔓州ユ 證治準 大門冬;赤芍藥 防風 缍 威靈化 胡麻子以草 角鳍羌活 荆芥穗 九節菖蒲 炒 莉 訁

銀定四库全書 君子湯母柴胡清肝散明 石每服四錢水煎 湯鬼愈湯見 桂 濁赤 四物二連湯見潮 清暑益氣湯 立見補中益氣湯見常 虚柴胡四物湯見往 見健 半夏白术天麻湯見 人多五氣湯俱見 四物湯 陽益胃湯 見清 脏 四

5 清胃散 當歸 補血湯見等 川芎 羌活 防風 燈冶單

| 多定四庫全書 川芎 防風 決明 消 五 治風熱筋摩骨痛 益氣聰明湯 天麻 最見滋陰地黄湯 紅花 加減金匮腎氣九胆 甘草 四七湯見 黄送芍藥湯具 見四神 羌活 致連翹 當歸 泄

易老祛風丸 たこの日本 秦光地黄湯 右水煎服 右水酒各半煎服 英荆子红 黄芪 荆芥 甘草 秦艽 生地黄 枳殻が防風 治風熱血燥筋骨作痛 治疥癩風瘡 白芷 當歸 经治準延 升麻 白芍藥 大力子 ち楽 川芎 羌活 甘草 防風

羌活當歸散 多方四月有書 四生散見中消風散見 右各另為末入二黄膏加煉蜜丸桐子大每服七 **一九白湯下** 枸杞子 羌活 當歸 **痒膿水淋漓** 治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊 2見 班 黄芩酒浸連翹 白芷 通過防風

大三日·三 /1 羌活白芷散 清肺飲 右水煎服 右用酒拌晒乾水煎服 羌活 猪牙卓角 錢 腫塊或膿水淋漓 黄芩清肺飲俱見小五淋散見 白芷 治風熱血燥手 軟柴胡 拨治準 荆芥 了皴裂或頭面生詹 一酒錢炒 防

多好四庫 右為末入前二味和丸梧桐子大每服六七十九空 大四两皇角 治癘病手足麻木眉毛脫落遍身生 体依前酒末 下以乾物壓之日三 徐去赐除乾煎 水一碗投成汁 一斤到寸 末 独破成磨並皆主之 寸许無厌酒 服閒日浴之汗 浸

當歸飲 1 風者服之反成癘風矣 虚腎經虚火脾肺氣虚過身作痒搔破成瘡或內熱 生風而眉鬢脫落或皮膚赤暈或捶起白屑而類癘 愚按前方果係癘風用之必劾若肝經血熱脾經血 藜 當歸 水煎服 1. L. 治血熱應齊痒痛 白芍藥 一 黄黄茂 为甘草 川芎 證治準輝 生地黄 何首鳥 防風 白族

多定四库全書 者婆治惡病論曰疾風有四百四種總而言之不出五 者 右為末每服三錢酒調下 胡麻 **走五風所攝云何名五風** 防風 白蒺藜炒去甘草以名 治風熱應齊掻痒或兼赤暈寒熱形病俱 石菖蒲 何首鳥水見荆芥穗各 口黄風二曰青風三 沙山药花

**上巴马巨人手** 隨落五風合五藏蟲生至多入於骨髓來去無礙壞於 人身名曰疾風疾風者是厲風之根本也病之初起或 如車行雷鼓之聲若食人皮皮膚頑痺若食人筋肢節 語變聲散若食人肝眉睫墮落若食人心遍身生瘡若 風生赤蟲黑風生黑蟲此五種蟲食人五藏若食人脾 風生五種蟲黄風生黄蟲青風生青蟲白風生白蟲赤 曰白風四曰赤風五曰黑風其風合五藏故曰五風五 師鼻柱弱倒鼻中生息肉若食人腎耳鳴啾啾或 推治準繩

赤白青鳥斑駁名曰濡風或遍體生瘡或如疥癬或如 爛悉為膿血或不痒不痛或起或滅青黄赤白黑瘦易 魚鱗或如榆炭或如錢孔或痒或痛黄汁流出肢節壞 不定病起之由皆因冷熱交通流入五藏通徹骨髓用 面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風如連錢團圓 力過度飲食相違房室不節虚動勞極汗流遍體因茲 如針錐所刺名曰刺風如蟲走名曰遊風遍身掣動名 曰瞤風不覺痛痒名曰頹風肉起如桃李小棗核從頭

金石口周白重

萬無有不差胡云迎摩羅病世醫拱手無方對治名曰 筋節火久壞散名曰萬風是故論曰若欲療之先服阿 積熱微五藏飲食雜穢蟲生至多食人五藏骨髓皮肉 魏雷九散出蟲看其形狀青黃赤白黑然後與藥療 にこの臣 公事 阿魏雷九散方 有不差 以物入山遂得疾愈而為神仙今人患者但離妻妄無 一報非也得此病者多致神仙往往人得此疾棄党 提出庫

多分四月白言 藥飲盡大飢即食小豆羹飲為良其多食但食半腹 右一十五味摶篩為散空心服一錢用清酒二合和 許即止若食多飽則蟲出即運日西南空腹更一 多少如前若覺小便似淋時不問早晚即更服藥分 ソ亦如前大飢即食若覺小便時就盆子中尿尿出 石 發出光青去足因各牛黄五紫鄉 石膽 紫雷丸 雌黄 雄黄 紫石英分 朱砂 整蘆 白飲 犀角四 盤 服

淨不可得見若出黑色蟲即是黑風不可理之無方 得藥者死死者即從小便中出大便中亦有出者不 白蟲似人涕唾或似魚腦或似薑致汁青蟲似緑或 **牧或三二十枚黄蟲似地黄色赤蟲似碎肉凝血色** 看之當有蟲出或當日即出或二日三日乃出或四 者大如小麥或出三五枚或五六枚或七八枚或十 日五日出或樂性建七日始出其蟲大者如人指小 似芫青色黑蟲似墨色或似爛椹又似黑豆豉其蟲

大三日日 Aiden W 拉治學地

金石口屋人量 病非正報也若出青蟲即是青風患氣由冷風至多 其蟲得便病即更加其患非冷熱風治如此此是横 悶即出湯數食草令飢虛則於人無力七七四十九 身一日再三度一入中坐浸如炊二三斗米项岩心 之如竈法安瓮不津者盛小便中當令使暖入中浸 可對若出黃蟲即是黃風當用小便七八升大寬盛 其點皆青即是東方木中毒風青蟲宜服自身小便 日即為一徹以瘥為度或一二年忌房室房室脈通

これりえ トトラ 常取空腹服之則不過一升三七日一日三服至四 法第一忌之至二七日一日再服服别四合服小便 之大香美好如羹如聚忌法三年犯即難瘥不犯水 辛猪肉雞犬穢食臭惡之食大嗔怒房室皆忌之服 亦名清陽亦名還中水服法空腹服一七日一服六 七日小便一出即服乃至周年以蹇為度服之不過 合旦起日初出即服服不過一升飢即食不得食五 一升百日外小便至少一日之中止可一度二度服 **经治準** 

苦參消石酒方是酒法 多定四库 全書 愈也 赤白乃是南風西風入五藏通徹骨髓成患為疾此 赤蟲者即是赤風同為一等療二風由熟為根蟲皆 之二風與苦參消石酒飲之除患最疾熱去其患即 右三味先與清酒下消石浸之二七日或三七日然 愈青蟲如此是横病非正報也出白蟲者即是白風 消石 清酒

大三日·司 (1) 為水能去熱根本若患赤白二風不問年月多者五 空腹服之一日三服初七日中一服如半雞子許七 年以外加黄消石加酒苦參乃至三四兩無有不愈 能治熱消石除熱消蟲亦白二蟲但聞消石氣皆變 至日無有不愈餘非難治何以故熟為根本故告參 亦多勿使醉吐寧漸少飲不用多飲亦白二風此藥 日後可飲一升任情飲之多則為善患去則速風動 後與苦參同入酒甕中盛浸之七日漸漸服之飲法 發治準繩

過兩大徹三大徹無有不愈針刺炙燒割劫亦不及 平復如本即止摩若不平復但使摩之以瘥為限不 當作大白膏藥摩之一日三四度七日徹或二三七 日徹乃至七七四十九日名曰一大徹頹痺即覺痒 不禁此為對治非正報也若人頑痺不覺痛痒處者 醋酪白酒猪魚雞犬驢馬牛羊等肉皆為大忌自餘 愈第一忌房室大腹怒大熱食禁粘食五年生冷大 乃至三十年無鼻柱肢節隨落者但非黑蟲皆得水

大白膏方 右一十味以苦酒浸藥經一宿取不中水猪脂十斤 銅器中煎令三沸三上三下候白芷色黄膏成貯以 黑膏摩之 瓶中隨病摩之即愈若遍體生溶膿血潰壞當作大 摩之為良乃至身上多有瘡痕生摩之悉愈 細辛為三當歸 白芷 白术 前胡 桂心雨一苦酒四 吴茱萸母一芎窮一蜀椒

九三日戶 AN

谁台半地

金以四月在十 後經一 右一十五味搏篩為末以猪脂二斤合藥煎亂髮消 洗之生毛即速出一大微眉睫如本與不患時同也 盡膏成用塗瘡上日三傅先以鹽湯洗然後塗之勿 令婦人小兒雞犬見若患人眉睫隱落不生者服藥 烏頭 百日外即以鐵聚輕拭眉睫處所一日三度 芎窮 雌黄 分松脂 别爱各如 班 雨 杏仁头皮巴豆 木防己

たかり B Ach 浸酒法 日 告参去上黄皮薄切曝乾捧令散莫使作末秤取三 和合調停然後即以五六重故紙繁完口用小瓮口 合上泥之莫使漏氣取酒服時法孔中出酒服之 十青石子如桃李雞子許丸過孔底上二三寸然後 下苦参消石末酒一時著瓮中中遣童子年十三四者 十斤取不津瓮受兩斛者瓮底鑽作孔瓮底著二三 服或再服亦得還如法密塞孔勿漏洩不得開 堪治华蝇

**瓮口取酒酒欲盡時開瓮取苦麥浑急絞取酒其滓** 鹽雪體濡燒之融似曲鱔見鹽為水消石真者燒煉 論曰苦參處處有之至神良黃消石出龍窟其狀有 酒至兩劑無有不愈依法如前雖良醫治之亦須好 有不愈若患不差除者皆由年多十年者更作此藥 去却其酒客處盛之莫使漏氣服酒法一一如前無 三種一者黄消石二者青消石三者白消石其形如 酒須行忠直不得不孝不義患除則速矣

LA A. ) Po col Li Miles 壞久久為好一切神鬼不敢近之矣 子小兜和合訖即告符書鎮藥符鎮在瓮腹令藥不 盡然後服藥得力其病速驗無疑符力亦是不思議 神力先服藥者無有不効又生造藥入瓮中時令重 長毒延年符能湯除身中五藏六府游滞惡氣皆出 諸蟲可以長生出鳥場國採無時 服藥時先令服 為下用之殺蟲皆不如黄者最良是百藥之王能殺 皆融真偽可辨三種消石黄者為上青者為中白者



雷九散 九三日年 公言 過食前調雷九散二錢 **霓瓶中用無灰酒一斗浸七日家封每服一** 右為細末取苦參五兩同硝石搗碎用生絹袋盛 雷丸 光二味 用盤 華盤 是 期光青去頭足 水飛此黃如研各紫石英和研犀角屑 證治準繩 兩 硝石五兩 刔 一本箇月之 浸酒 一 盏温 用細

金万四月分言 冶寫風白花蛇丸 備列馬 右為細末研令匀每服一錢空心清酒調下 致拘方取足則畢世不成矣小有出入亦何不可故 右二方皆本耆婆方而増損之傳用皆効以藥有 雷丸 角屑 白斂 雄黄纸水 碌砂纸水滑石 阿魏舜半 黄西研盤登上班光青在四十箇去頭 丹陽判上舍得薦疾一僧療之而 紫石英研屋

L'elous Like 領中因醉之而竊錄馬用者多効 瑜以數百金求方秋不肯傳館賓表生窺知藏衲 麻子,莫荆子私一槐花 苦参 生地黄私二 防風去前荆芥穗 一雨黄茶 白蒺藜 何首為不正牛膝去牛蒡子 連翹 一两 與與鞋踏去土漏畫半斤洗淨去日去照與完二雨用草漏畫半斤洗淨去 黄連 隆出年地 一兩 山梔子 金銀花士報川芎雨枸 細辛 黄檗 金毛狗脊 全蝎 胡 醋用

行樂方 右共為細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙調服 茶清送下空心午後臨队各一服 右共為細末米糊為丸如梧桐子大每服五六十九 大黄 加風藤一兩 者加香白芷而如肌肉漬爛加大早角一兩一僧 白花蛇一件去頭尾鳥稍蛇一件去頭如上頭面 白掌牛 檳榔口西 甘草两輕粉五

アハコラ たよう 防風天麻丸 故其効如神 中常療數人初服藥有嘔吐者不可怪服藥得安如 輕者一月一次或二十日一次以三五遍為度 五更時進病勢重者七日行一次稍輕者半月一次 蔓荆子 防風盖天麻 威靈仙 人参生丹参生苦参生之参生紫参生 治薦風癩病此方料是神仙所傳一年 升麻 隆台平地 穿山甲沙何首烏各一兩 白附子地定風草 細辛

一般墨九 金分四月全世 煉塞和丸共作九十九每服一丸細嚼溫漿水送下 尼房勢將息慎口 淘淨晒乾炒香熟另碾為極細末與樂末一處拌勻 右為細末與何首烏末拌匀每藥末二兩胡麻一升 不拘時候日三服宜食淡白粥一百二十日病人 蜈蚣サー 飲墨姓 两頭尖 治癘風神効 甘草、香白芷 防風去產

乳香丸 とこのう 常用文武火慢熬令小沸為候一伏時取出瀘去祖 右先用好酒五升浸苦參於瓶內以重湯煮一 將酒浸乳香於銀砂石器內煎如傷入天麻為末 温酒送下茶清亦得日進二服 右為細末酒糊丸每兩作十丸每服一丸食後細嚼 通明乳香五十 乳香三班川芎一 治癘風神効 W 告参差到 盛治準繩 而五靈脂 声两 好 看 沟 雨 去 一伏時

紫茄子根散 大麻仁酒法 散相問服之 煮數沸即止每服一小蓋溫過下藥仍兼紫茄子根 桐子大每服二十九用酒送下空心及晚食前服之 麻仁二两另入於乳香膏內攬令勺慢火熬之九梧 宿和酒研取白汁用生絹瀘過却入甕瓶中重湯 紫茄子根 兵相切縣白芍藥二兩 炙甘草 大麻仁三升水淘淨候乾以酒一斗浸 兩

到近四年 全書

**为已日巨人馬** 神仙退風丹 房事一切發風之物只喫淡粥一百日皮肉漸皆復 右各等分為細末煉蜜和丸如桐子大每日空心日 邊取三十丸便服並用羊蹄根自然汁下大忌酒及 中臨睡各服三十九又每夜第一次睡覺時急於頭 自早至晚常令均匀服之 右件樂末相和令勺每服二錢溫酒調下日進三服 知母 貝母 烏梅肉 證治準繩 海桐皮 金毛狗脊

天麻散 金艺口屋人 舊半年後須忌房事服藥時每夜專用一二勤謹 妙者不禁忌恐無益也 就病人睡處坐守等候第一次睡覺時便扶起喫藥 服華官使親見林承務服之取効治為風如此神 威靈仙 甘菊花 天麻二何首鳥 治一切厲風癩病 荆芥穗 牛蒡子炒各衛荷半 胡麻子名"蔓荆子 地骨皮 告参其白蒺藜 菖蒲

夢判子散 治肺臟蘊熱風毒如瀬變成惡風 古多散 九四日 二十 先食前服半月次食後服半月大有神効 右為細末每服三錢溫酒調下茶清亦得日進二服 右為細末每服二錢煎荆芥湯調下茶清亦可日進 二服不拘時候 曼荆子用甘南花 枸杞子 告参云 人本 雨天南星餐胡麻各人雨炒 ニャニ

猪肚食之如吐了須再食之食罷待一二時用肉湯 右用苦参末掺猪肚用線縫合隔宿煮軟取出洗去 用生絹瀘去查後再入苦冬末攪熟稀麵糊膏子相 蛀卓角一升去皮ն及子搥碎用水四盆煮至一盌 調無憂散五七錢俟取出小蟲一二萬為効後用不 元樂先不吃飯一日至第二日先飲新水一藍後將 似取出放冷再冲入後藥相和 苦多取頭木得肚一具

何首鳥散 欠ショロ 荆芥麻黄煎洗浴 右為細末入卓角膏子為丸如桐子大每服三五十 九溫酒或茶清送下不拘時候日進三服後用苦台 何首鳥一年入白米泔浸 三去 何首鳥去皮防風去產 九兩 晒 治厲風癩疾 经治洋艇 當歸一兩去 今碎九卷九晌胡麻子一十日夏月透明麻子

追命散 末覷虚實加減服之取下蟲多年者其蟲色黑日近 右為細末每服三大錢用好真小油入無灰酒調藥 止其藥後只服平常風藥及諸補藥此藥大有功効 右為細木每服二錢食前溫酒或薄荷湯調下 者其蟲色亦隔三二日再服直候無蟲方是病蹇即 下藥切不可許病人知恐蟲藏匿則病難愈六十日 川大黄 阜角刺西 川鬱金五

六香散 į 右除三柰子另研餘七味同為吹咀分作四劑每用 伏幸聽信 百聲最好心絕一切惡念此病易療故發善言戒勸 內用清齊戒房色態却一切俗念亦不可嗔怒常 口念孝經善言服秋者教難觀世音菩薩名號萬 藿香 川当而二三素子用 甘松士零陵香 香白芷 茅香女士香附子 1. L. 淋洪癩病其效如神 證治準軍

一多定四库 全書 八金散 中洗了拭乾用八金散點若熟不可飲冷水 處須令暖和得所一月之間不可出外水火亦就其 **血出盡然後淋洗一伏時洗一番浴室母令透風臥 乗熟洗瘡若瘡不破用錢針於疙瘩瘡上刺破令惡 剷以水六大碗煎至三碗去查却入三柰子攪匀** 金精石 石膏 滑石 **!** 銀精石 禹餘糧石 陽起石 玄精石 磁石

~ つつっ 匹日 擦上樂無治疙瘩擦樂之後大忌飲水宜禁身靜坐 先洗瘡處拭乾便用小油調稠硬作劑子於有瘡處 輕粉一錢研令不見星子却入餘藥再研与令患人 濟口以文武火煅煉紅透放冷研如粉入水銀半兩 右件各等分碾末入金銀鉗鍋子内盛之用鹽泥固 至三四日口中涎出為度二次樂了用貫衆湯漱其 口不可嚥下藥汁兩手便洗淨不可近口鼻耳目第 伏時依前上藥第七日不可更用見効即 姓治 準 繩

國好四月全書 實眾湯 深洗鸡瘡藥 黄連 石每用十兩水一斗煎數沸無風處洗出汗 右為吹咀用淨黑豆半升水三盌煮軟岩用前藥里 將此樂急漱其口以去其毒恐傷牙齒也 貫架 何首鳥 漱口安牙 兩 荆芥 防風 卷二十 馬鞭草 一方加

とこの年から 一 右為末臘猪油調搽外毒既去却搽黄連散 傷良內不宜多用 洗樂雖能疎通腠理而損元氣解毒散雖能攻毒而 巴豆肉 寒水石谷五 治癘瘡清熱解毒 治風瘡解外毒 猪牙早角 皮硝西 證治年經 羊蹄根 黑狗春年白芷 輕粉 蟬蛇土枯 愚按

白丁香散 治癘風眉鬚已落却令再生 右為末唾津調塗之 右為細末人乳汁調點眼內 烏芝麻油十丁香 白丁香 黄連五五倍子 討黎勒皮 治癘風眼中生胬肉 貝母 7年基計 生鐵末公 附

次記日年上 生眉膏 例柏葉丸 服五十九熟水送下日三夜一服之 右件藥九蒸九曝為細末煉審和丸如梧桐子大每 埋三七日藥成塗之便効 右為細末入油及生薑汁中以不淨器盛於馬糞中 白花蛇 側柏葉な物 治眉毛脫落 治癘風癩疾令眉鬚再生 烏蛇 證治準繩 糞以土馬鬃 144

**蛜邺九醬治鶴滕風及腰滕風縮胡楚望博士病風疰** 右為末用生薑汁調匀擦在眉上一日塗一次為住 手足指節如桃李痛不可忍服之悉愈 骨皮 研 没藥工分 乳香工分當歸 姊郎 是全者白附子 鶴滕風 羌活 北漏蘆 芍藥 威靈仙 安息香 阿魏研桂心 桃仁雨生同 白芷春

とこうシ シャラ 換骨丹通治風無治鶴滕風 右十六味螂鄉桃仁白附子阿魏桂心白芷安息乳 右為末酒糊丸服 樂為末審九彈子大空心溫酒化下一九無時 香沒藥丸味同童子小便并酒二升炒熟另處入餘 敗龜板 防風 **站根洗淨養木** 秦艽 當歸 単解 證治準繩 雨 虎骨 两 羌活 松節 枸杷 獨活

金好四月全書 经進地仙丹 無力 右為末酒糊丸桐子大每服四十丸空心溫酒下 草 烏 兔絲子 製羌活 補去毛各 极去月及閉 南星製草解 者炒 川鳥地一 出 治腎氣虚憊風溼流注脚膝痠疼行步 內附子 晚葵茶酒浸焙覆盆子 白附子 地龍土木龍三两 巻二十七 黄送兩半茯苓 赤小豆 防風 狗脊去烏藥 牛膝酒何首 白木 骨 廿

**地田田 新** 八防風湯 附骨疽腫痛或腫而不痛不問己潰未潰用三五劑 後更用調補之劑 熟地黄 膝錢各 五分辣桂 治足三陰經虧損外邪無虚患鶴膝風或 各五 雅治準繩 今五白芍藥 人補湯俱見 防風發二杜神 虚勞 附子

羌活防風湯你治 六君子湯 補中益氣湯堤幣 金好四母全書 右水煎服 草雨 補血湯見等 羌活 各四地榆 破傷風 防風 破傷風脈浮弦初傳在表 細辛 川当 四物湯 珍湯 當歸 四君子湯 虚俱 夢見

防風湯 九味羌活湯 用之 右㕮咀母服五錢水二 17.1 7.15 右吹咀水煎服後調蜈蚣散大効 防風 一加污風白木多半 羌活 治破傷風同傷寒表證未傳入裏急宜服此 熟盛加黄芩黄連為二大便秘加大黄而自 羌活 防風 獨活 踏治耳繩 蓋煎八分熟服量緊慢加減 川芎谷等 細辛我川芎 白芷

蜈蚣散 白 右為細末用防風湯調服如前藥解表不已覺直轉 己上九味吹咀每服一兩水煎 此樂 人裡當服左龍丸服之漸漸看大便輕硬加巴豆霜 小污風湯 生地黄 蜈蚣り魚無五我 黄芩 若服前藥已過藏腑和有自汗者宜服 左蟠龍 甘草西 ]半两 畫 ヴ

考黄湯 沙巴四軍公書 破傷風藏 温服 宜速下之先用芎黄湯三二服後用大芎黄湯下之 石為㕮咀每服五七錢水一蓋半同煎至一蓋去查 右吹咀每服七錢水二蓋煎一蓋去滓溫服 川芎雨黄苓或甘草残二 私小便亦用熟藥自汗不休故知無寒也 防風雨=

江鰾丸 大芎黄湯 金はなれるか 硃砂為衣又用一分入巴豆霜澀錢同和亦以燒飯 右為細末分作三分先用二分燒飯為九如桐子大 右為㕮咀依前煎服以利為度 白種類學兩 川芎成大黄生黄芩 羌活士 江無半雨野傷糞半雨难黄一致蜈蚣外天麻 治破傷風騰而發搖藏腑私壹知病在裏

大色日春 A 新 左龍丸 右為細末燒飯為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒 處合服名左龍丹每服藥中加一九如此漸加服 送下如裏證不己當於左蟠龍藥末一半內加巴豆 為九不用殊砂為衣每服殊砂為衣丸藥二十九入 霜半錢燒飯為丸如梧子大每服一丸同左龍九 巴豆霜丸藥一丸次服二十丸漸加至利為度 左蟠龍 白殭蠶 造治準地 無五半两在黄元奸水

羌活汤 地榆防風散 氣入胃全養血為度 右為㕮咀每服一兩水二盞半煎至一盞去查溫服 如有熱加黄芩有涎加半夏若病日久氣血漸虚邪 服後藥羌活湯 十九以利為度岩利後更服後藥若搐痉不已亦宜 羌活蓝獨活並防風毒地榆西 治破傷風搖閉不通 治半表半裏頭微汗身無汗

**犯記司事公轉** 養血地黄當歸散 白术黄芪汤 右為吹咀每服五錢水一盞半煎一盞溫服 右為細末每服三錢溫米飲調下 建布 細辛五錢 當歸差地黄 白术沒黄送 地榆 防風 芍藥 治破傷風日久漸虚邪氣入內 地丁香 遊治準編 錢 川芎 馬齒草兩 **藁本基防風盡白** 

蠲痙湯 白术开麻湯 多りでん 右木煎食遠服 右水煎食前服 右前四味以水一蓋煎七分入杏仁和匀服之 羌活 白术 1:17 獨活 黄茂谷一乾富分井麻 防風 地榆錢各 杏仁妆

一九七日草私等 玉真散 硃砂指甲散 右製度為細末分作三服酒調下 右為末生薑汁調服傷處 南星 防風分等 人手足指甲少姓之獨活 症 碌砂研天南星 量製

括其桂枝湯神治柔空 麻黄加獨活防風湯四治剛痘 右到細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫服 右六味以水九升煮取三升分温三服取微汗汗 麻黄小桂枝的一芍藥而甘草即獨活 抬夢根二桂枝三芍藥四甘草二生薑三大東 <u>[</u> 防風る

一次包甲全書 一 大承氣湯 以根湯金 右七味吹咀以水一斗先煮麻黄葛根減二升去沫 粥餘如桂枝湯法將息及禁忌 内諸藥煮取三升去浮溫服一升覆去微汗不須吸 出食項吸粥發之 葛根兩麻黄三兩桂枝二两与藥 生畫五天東北二 靣 验治準鄉 足甘草

海藏神术湯 右煎服 止服 右四味以水一斗煮二物取五升去浑內大黄煮取 錢如太陽脈浮緊帶洪者是無陽明也加黄芩 "婦 二升去滓内芒硝更上火微一二沸分温再服得下 養术製防風兩二甘草少 酒洗厚朴 如太陽證發熟惡寒脈浮而緊者加羌活 治內傷冷飲外感寒邪而無汗者 去皮矣 积實五 芒硝 兩

欠三日巨 公馬 又白术湯 海藏白术湯 右吹咀每服三錢水一蓋薑三片煎至七分温服 日止一二服待二三日漸漸汗少為解 乳煎成調六一散三五錢神効 服者加當歸或木香湯或加豪本湯路! 白术三防風五世草八雨 用茶术 防風雨如汗出改防風雨 上解三陽下安太除 治內傷冷物外感風寒有汗者 證治率 繩

金与四月八日 加大黄线 柴胡兩半夏 湯或石膏 貨知母兩白此代 右吹咀水煎至七分温服用後方加減 飲者加黄芩甘草 川芎或細辛 量虚實加減之邪去止服 治傷風項背强及有汗不惡風者 兩 心下痞者加积實 鉞半 去出 往来寒食而嘔者加柴胡散 頭疼惡風者加羌活散或羌活 ፤ 岩身熟目痛者加石膏 腹中痛者加芍藥湯 若發熱引 者有東證

柴胡加防風湯 桂枝加川芎防風湯 欠三日豆 公司 柔痤 右每服一兩水三蓋煎至一盞半去查溫服 兩大東六 桂枝 寒熱脈弦此少陽風痙 聖製服法一與前為很 ち樂 治汗後不解下静作躁目直視口噤 生薑兩半甘草 治發熱自汗而不惡寒者名曰 经治準繩 防風 川芎多

金月口眉白書 防風當歸湯 右每服一 張者太陽無陽明也宜去風養血 石煎服法 畫 防風 柴胡 雨水三盏煎至 當歸 防風雨 與前同 治發汗過 川芎 隶枚 半夏製六人 地黄雨 發熱頭面搖卒口噤背 盞温服 見虚

九三月五 公子雨附子二 加味四物湯即四物湯加柴胡壮補中益氣湯見劳 物白木散 脈拘急汗不出恐陰氣內傷 白木 茯苓 五味子和半桂心如麻黄和良事 治傷寒陰經一二日面腫手足厥之 拉治运嫌 参附湯見自 三一承氣湯風中 見虚

桂枝加芍藥防風防已湯 险也必腹痛 無時 每服一雨水三蓋煎至一蓋半去查温服亦宜小 每服四錢水一大蓋薑五片同煎至五分去查溫服 命汤 桂枝+ 所房風 防己的一芍藥而生事! 治發熱脈沈而細者附太

九己可取 公馬 桂心白术湯 附子 每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至七分子 不止 頭項强直頭搖口噤 每服三錢水一蓋棗一枚煎至五分去滓 白术 桂心或附子也 治傷寒陰痙手足厥冷筋脈拘急汗出不止 防風 治傷寒陰痙手足厥冷筋脈拘急汗 也而白术雨川芎質獨活兩 甘草 超治準地 桂心 川芎 附子谷等

附方 附子防風散 多罗巴万人 查温服 拘急汗出不止 每服三錢水二蓋生薑四片同煎去查温服 分柴胡-白术而防風 + 雨五味子 | 桂心 | 平 治傷寒陰痙閉目合面手足厥冷筋脈 甘草 茯苓 附子

**東定羽車全等** 麥門冬散 不拘時 右為吹咀每服五錢水一中蓋煎至五分去查溫服 肢疼痛烦燥心悸睡卧不得 屬羊角 犀角 防風盡扶神去此胡盡麥門冬 3.人参畫葛根 治傷寒陽痙身體壯熱項背强直心膈煩 治傷寒陽座身熱無汗 积散是於甘草或半 石膏 经治準地 惡寒頭項強直四

石膏散 金少口匠人 右為吹咀每服五錢水一大 蓋煎至五分去查溫服 燥發熱惡寒頭面赤色四肢疼痛 角屑纸半 苓 兩 石膏而秦光主龍齒各一兩犀角屑七纸 麥門冬出地骨皮 赤芍藥 治傷寒陽痙通身壯熱目眩頭痛 白鮮皮 麻黄品赤茯苓去知母 前胡 黄

**史記写事 合等** 防風散 右為攻咀每服五錢水一大蓋煎至五分去查溫服 右為吹咀每服五錢水 不拘時候 不拘時候 七莖同煎至五分去查入牛黄末一錢半攪匀溫服 草矣七石膏二 防風毒大通 治傷寒陽痘壯熱不解筋脈拘急牙關緊 兩 麥門冬七川升麻 葛根西 经治準鄉 大盖入豈政五十粒葱白 4

金万口工 一十二 黄散 心神煩燥 石為細末同研勺每服二錢竹瀝調下不拘時候 皮 瘈瘲 天麻线半 泊心虚風筋脈壓 盡考虧 **淫發熱惡寒頭項强直四肢拘急** 卷二十 甘堂 播神昏語澀 冬日桂心 地骨

京幣丸 Ī 右為細末和勺再研每服一錢豊淋酒下 侧子炮去獨活上而 天麻 龍膽木防風末青黛冊名 雨汝全蝎 好題難 外桑螵蛸 黄連木五龍腦 防風 龍腦 甘新花 设治事 犀角和麻黄七线 我的的藤就上牛黄 夢半子 盛羊角 蟬蜺 桂心 阿膠炒 細主

婚断九 多兔四库全書 右同研麵糊為丸栗米大每服三五丸至一二十丸 右為細末塞丸如桐子大每服百丸白湯下 煎金銀湯送下溫服 續斯酒川芎 治中屈旬汗 治肝勞虚寒脇痛眼昏摩縮爽痰 當歸淡半夏製橘紅 参益氣湯見者

少定四軍公等 胃風湯 毎服 身 残谷 獨活 豆蔻 白芷 錢各 雨水二盏薑五片煎八分食後溫服 遠志 甘草 羌活 分井麻或葛根 文 ) 半二 一条柴胡 不去節 半夏 推治準地 分 桂心 葉本 防風 蒼木 白薇 羌活 當歸 菖蒲 黄檗 細辛 孜

續命煮散 ラジロア 者加牡蠣粉 每服一兩水二蓋生薑三片煎至八分通口服汗 防風 樂 |鍾薑三片棗二枚煎八分溫服 ノニマ 桂心と 外 消風化痰 川芎 獨活 錊 甘草 當歸 表二 熟地黄 遠志 細辛 荆芥 葛根 茍

**火之刀戶 全等** 補中益氣湯 加味逍遥散 後播搦 右為末每服三錢薑三片水 荆芥 川当 見写 蔓荆子 热田 飲料 珍散 ij 獨活 治平 切失血筋脈緊急產後與 下全大補湯 學 兩各 兩 四君子湯度見 大蓋煎七分食後服 涃 藁本 季 涝

交加散 增损柴胡湯 劾 右為細末每服二錢水一盞酒少許煎七分灌下神 先以炒大豆黄卷以酒沃之去黄卷取清汁調前末 尽服童便亦得 二五錢和浑服之輕者一服重者二三服即止氣盡者 當歸 治瘈瘲或頭振或産後不省人事口吐痰涎 荆芥穗分 治產後或經適斷手足牽痛延潮昏問

**欠記司的 心** 秦光湯 服 右分二貼每貼水二盏薑三片煎八分食遠服 石為粗末每服半雨水二 防風 秦光 知母 前症已去次服此樂去其風邪 芍藥 炙甘草线 錢 柴胡本 證治準 绳 半 一盏畫五片東四枚煎 一致甘草二分 鋑 石膏或黄芪 一 英黄芩 五

獨活散見與 金分四月白書 星附散 石吹咀每服五錢水酒各 顫振 鳥去皮種類 風雖能言口不唱斜 夏養人参 一盏煎八 黒附 手足彈曳 八分熱服并 · 大皮白附子 筝

1) 10 m / 11/25 右十味吹咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中清封固 勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去浑日服 会 姜 活 金牙印如米粒用地膚子 合常令酒氣相接不盡一劑病無不愈 鎮火平肝消痰定顫 用獨活 附子 防風 證治準繩 丁無子用蛇东子熟地黄 細辛 雨各四川 椒

多好四周名言 右末以竹涯 治氣虚顫掉 錢五分尽 維羊肉 童便製 白状 **钱**无 五

起羽草を動 右為細末求 7補心丹 南星銀石菖蒲我 酒洗 兩半 分食前服 治心虚手振 그 + 川芎 一切相子仁 禮治準經 香线琥珀 錢非 去油 兩 兩 七钱木

私方定振力 金罗四万八二 振 我白术 地黄 易見疾 **或温酒送下** 酒糊丸如梧桐子大每服七八十 黄送五年 治老人戰動皆因風氣所致及血虚而 洗川当 我 處靈仙五线 去頭 細辛 雨 兩 熟地黄

**处三口甲公害** 服之 搗散以水二升取末數匙作粥空腹服之 官桂 大鳥頭 癴 白芍各一 石筋脈拘摩久風溼痺 細辛 半乾薑 川椒 超治車繩 甘草 能轉側冬月 のナハ 防風災當 附子

金好四月白書 去查空心食前服 右以醇酒二斗漬 右為細末每服三錢水一 **重薏苡仁湯** 白嶽 獨活一百 甘草西一 養改仁 不耐酒服五合 宿微火煎三沸 附子 ち樂 不可屈伸 **蓋半聚二枚同煎至** 桂心 酸棗仁 每服一升日

とこり豆 養血地黄力 酒下空心臨即服 右為細末煉蜜和杵丸如梧桐子大每服五十丸溫 車解 **\*\*** 用甘逐末三錢積猪腰子細批破少 山樂 在内荷葉包裹燒熟温 乾漆の蛴螬 澤寫 验治準绳 丁膝的 兩 酒嚼服之 (我黑狗春炎地 四九

活血通經丹 金好四年生書 桂枝 二盏煎至一 治筋 酒檗翁 · 剪 肉桂 蓋去查熱服 藥分五 葛根 附子 東痛秋宜服之 ٠: 獨活各一 **鲜料防風** 灵甘草 當歸 白

防風散 .J. 5 右為細末每服二錢溫酒調下日三四服息生冷 順毒滑魚內 防風盡五加皮 分取清汁服日可二三服 1.1. 治風虚勞筋脈拘擊腰膝疼痛 泛 横斷 桂心 社治净 是意改仁 熟乾地黄 鼠粘子 海桐皮 盛半 黄、芪 积

数定匹庫全書 黄茂丸 麥門冬散 不得睡卧 每服五錢水一中蓋生薑五片煎至七分去查溫服 麥門冬以我神本柴胡盖黄芪盖白术士 兩 防 府外十十草の半 風虚赤芍藥 治風虛劈四肢羸瘦心神虛煩筋脈拘壓 治風虚勞筋脈拍掌四肢疼痛心神煩熱 积散 かちち 酸聚仁

**处包日臣 公** 一黄湯縣治中風手足拘擊百節疼痛煩熱心亂惡寒 右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服 不進飲食無治賊風腮腿風半身不隨失音不語 三十九温酒送下不拘時候 杞子 防風拘擊方 立蘆人 盛羊角屑线半防風毒遠志去心各 酸棗仁 **濫熟乾地黄** 拉治準繩 羌活蓝當歸其桂心 档

金罗口工 白電 地黄湯 實一我 为加瓜宴根\* 右為㕮咀每服四錢水一盏半煎至七分去查溫服 不拘時候取汗為効 石為吹咀用酒三升水七升煎至四升去查分作 乾地黄 治中風四肢拘奪 去節黄香半雨黄芩半獨活一雨一雨黄香去產 氣逆加人多火线 甘草 麻黄各節兩 寒加附子一枚丸 心熱加大黄和 心悸加狂嗎七気 脹滿加积

次之四年 台書 去查温服不拘時 右為吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分 奢唇清白不思飲食 服不拘時日進二服 疼痛手足爪甲疼痛脚轉筋甚舌卷囊縮面色 治中風虚極筋脈摩急手足拘摩屈伸短縮 虎脛骨馬五加皮 人参蓝柏子仁 設治準繩 黄香雨 養桑寄生 炙甘草 酸

酸聚仁丸 金少に正 三聖散一名行大治手足拘擊口眼唱斜左癱右爽骨 卧 右等分為細末每服二錢空心臨即溫酒調下日進 節痰疼脚弱無力行步不正一切風痰 服唯孕婦不可服 酸東仁 當歸去內桂去粗 治風毒流注四肢筋脈拘摩疼痛少得睡 羚羊角盾 玄胡索 苯二 晚盤砂炒防風盖檳榔

火色可重 公事 百倍丸 石為細末酒煮麵糊和丸如梧子大每服四五十九 九溫酒送下不拘時日進二服 右為細末煉賽和搗二三百下丸桐子大每服三十 藥研骨碎補去破故紙 自然銅幣牛膝酒浸 敗龜所虎骨粉 雨 治男女中風腰膝疼痛筋脈拘摩行步艱難 稻子仁 肉發養源木鼈子般乳香研沒 拉泊準 繩

金罗口屋 有重 續斷九 空心温酒送下日進二服 右為細末以煉蜜和丸每兩作四丸每服一丸細嚼 溫酒下不拘時 續斷 \*桑白皮 塵羊角屑 治中風寒溼筋摩骨痛 草解沒牛膝酒乾木瓜 治肝風筋脈拘摩四肢疼痛 兩甘草 酸囊仁 一条栀子仁和半川升麻 羌活士の半 杜仲到炒去 防風 絲

北町り巨 今号 酸柔仁散 卧不得 查温服不拘時 右攻咀每服三錢水一中蓋生畫五片煎至六分去 右為㕮咀每服三錢水一中蓋入生薑五片煎至六 分去查温服不拘時思熟麵猪肉大蒜 甘草作為先活悉防風士進年教羊角骨非 酸聚仁而桑白皮 治肝風筋脈拘擊四肢疼痛心神煩問睡 經治年四 考察 甘药花

防風散 飲食 右為吹咀每服五錢水一 分去查温服不拘時候 麡羊角屑 防風去麻黄去節各 治肝風筋脈拘奪四肢疼痛心膈痰壅不思 · 虚常歸本大黄 犀角骨的 雨 赤茯苓 \*\*薏苡仁 中盖生造五片同煎至六 炙甘草丽 杏仁髮炒 入为沈白术 膝浸酒

| RhJanel Like | 型 |
|--------------|---|
|              |   |
| 注注注          |   |
| PA+P         |   |

| 益治準繩卷二十七    |  |  |  | 金はんでんろう  |
|-------------|--|--|--|----------|
| <u>秦二</u> 十 |  |  |  | <b>3</b> |
| 七           |  |  |  | なニナ 七    |
|             |  |  |  |          |
|             |  |  |  |          |